

Maurice PIC


DIVERSITÉS ENTOMOLOGIQUES XI


(4 AVRIL 1952)

MOULINS

“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”

15, RUE D'ENGHIEN, 15





Contribution à l'étude des *Pilemia* Frm. [Longicornes]

Le Docteur Breuning a récemment rédigée une révision du genre *Phytæcia* Muls (Entom. Arbeit Museum G. Frey B-2, 1951) où figure (p. 5 et 37) l'ancien genre admis *Pilemia* Frm. abaissé au titre de s. g. de *Phytæcia* Muls. La classification patronnée par Breuning bouleverse beaucoup celle du *Coleopterorum Catalogus*, d'Aurivillius. Ici, je ne veux, ni formuler de critique, ni exprimer des louanges, je me contente de constater les faits. Le Docteur Breuning a groupé comme s. genres de *Phytæcia* Muls. 10 sous-genres qui, pour la plupart, anciennement étaient admis comme genres. Dans cet article, je me suis limité au sous-genre *Pilemia* Frm.

Voici les caractéristiques du sous-genre *Pilemia* Frm. (ex Breuning). Yeux fortement échancrés (ils sont subdivisés dans le s.-genre *Opsilia* Muls) ; antennes normalement amincies vers les derniers articles (ces organes sont indiqués comme non amincis vers les derniers articles dans les deux s.-genres *Blepisanis* Pasc. (ayant pour synonymes *Obereina* Glb., *Fulgophytæcia* Pic, *Rubrophytæcia* Br. et *Pseudoblepisanis* Br.) ; Mandibules bicuspidés (mandibules unicuspidés ou très rarement bicuspidés, mais alors les élytres parallèles, chez de nombreux sous-genres) ; élytres rétrécies à partir des épaules.

Les espèces, au nombre de quatre, sont séparées (ex-Breuning) par les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues (*hirsutula* Froli et var (1), ou deux fois plus longs que les joues (*annulata* Hampe avec la s.-esp. *Wa-*

(1) Breuning a substitué le terme **morpha** aux anciens qualificatifs **variété** ou **aberration**, mais je continue à me servir du terme **var.**

werkana Reitt., *tigrina* Muls., *griseomaculata*, Pic), puis, par l'ongle accessoire des crochets des tarses soit court et large (*annulata* Hampe) ; soit à la fois long et mince (*Tigrina* Muls., *griseomaculata*, Pic). *P. griseomaculata* Pic. se distingue nettement de *tigrina* Muls. par les tâches blanches des élytres plus nettes et plus régulièrement disposées, très distinctement détachées du fond des élytres qui est plus ou moins brillant ; les mouchetures chez *tigrina* Muls. sont plus irrégulières et moins nettes et le fond des élytres n'est pas, ou est peu, brillant. Le docteur Breuning ayant admis ou décrit, chez certaines espèces de *Phytæciaires*, des *morphes* : *var.* ou *ab.* ayant une tache rouge, petite ou étendue, sur le pronotum, soit cet organe avec ou sans macule, il n'y a pas de raison pour ne pas étendre ce système au sous-genre dont je m'occupe ici et c'est pourquoi je donnerai des noms à plusieurs modifications spécifiques, toutes de ma collection, que je vais successivement présenter.

***tigrina* v. n. *angusterufonotata*.** Pronotum (1) ayant une étroite bande transversale rouge ; en surplus, forme assez étroite et petite taille. Long. 6 mill. Morée.

***tigrina* v. n. *breverufonotata*.** Pronotum orné d'une macule discale rouge pouvant varier. Brousse, en Asie M^{re} (Pic). Smyrne. La forme typique n'est pas décrite avec une macule rouge au pronotum.

***griseomaculata* v. n. *laterufonotata*.** Au lieu d'une macule rouge, le pronotum a tout son milieu largement rouge. Akbès.

***Annulata* v. n. *angorensis*.** Pronotum muni d'une petite macule rouge. Angora.

***hirsutula* v. n. *Tournieri*.** Forme assez étroite, élytres nettement et assez régulièrement mouchetés, moucheture petites ; antennes, sous certains jours, à vague

(1) J'emploie le terme de Breuning, à la place de thorax, ou de prothorax.

teinte roussâtre et très nettement annelées. L. 8 mill. Sicile (ex coll. Tournier).

hirsutula v. n. **Holtzi**. Forme étroite, élytres à revêtement uniforme à peu près gris, simplement parsemés de points dénudés ; thorax avec trois bandes claires très détachées. Morée (Holtz).

? *Pilemia vagecarinata* n. sp. Forme assez robuste et un peu allongée, nettement atténué postérieurement, noir à fond brillant, en partie revêtu d'une pubescence blanche formant 3 bandes sur le pronotum et des mouchetures sur les élytres, suture densément blanche, mandibules paraissant simples. Antennes assez longues, amincies à l'extrémité, un peu teintées de fauve à l'extrémité. Lobes inférieurs des yeux à peu près de la longueur des joues. Pronotum assez large, à ponctuation fovéolée, ainsi que celle de la tête. Elytres nettement plus larges que le pronotum, peu longs, progressivement atténués en arrière, à ponctuation assez forte, irrégulière, avec une faible carénule latérale partant des épaules sans atteindre le sommet. Membres noirs ; ongles des tarses simples. Long. 12 mill. ? Syrie. — Espèce à classement douteux, ressemblant en même temps à celles du s.-g.

Pseudocoptosia, Pic et à *Pilemia hirsutula* Froh., caractérisée par la présence d'une faible carène humérale.

Lors de mes voyages en Orient, je n'ai recueilli que quelques exemplaires isolés du s.-g. *Pilemia* Frm., qui sont : *P. tigrina* v. *brevetufonotata*, Pic, à Brousse (cité plus haut) et *P. hirsutula* Froh. en mai, deux exemplaires un au Phaleron près d'Athènes, l'autre à Corfou : Peleka (17 juin 1901).

Pour *P. hirsutula* Froh., j'ai la sous-espèce (selon Breuning), *obsoleta* Gglb., de Missis, recueillie autrefois par un de mes récolteurs arméniens et je rapporte à la s.-espèce *homoiesthes* Gglb. quelques exemplaires de Sultanabab, ou de l'Alai (ex. Korb.).

Coléoptères divers nouveaux ou peu connus - Notes

Je possède un exemplaire ♂, d'origine russe, de *Cardoria scutellata* F., ayant une coloration noire, avec les membres en partie roux, densément revêtu de pubescence en-dessus grise, le dessous du corps ayant les côtés de la poitrine et les bords postérieurs de l'abdomen à bordure dense de pubescence blanche. Le thorax est excessivement large, débordant la tête et aussi la base des élytres, l'écusson n'est pas orné d'une pubescence de coloration tranchée. Long 14 m. Je propose le nom de *v. obscuricolor* pour distinguer cette modification.

Musaria puncticollis-v. n. turcica. Avant-corps rouge avec le thorax orné de 5 macules noires, sommet de l'abdomen marqué de rouge, repli huméral taché de rouge, antennes (à scape roux, mais base noire) noires, marquées de roux au sommet du 3^e article; pattes largement rousses, toutes bicolores, les postérieures plus brièvement claires que les autres. Turquie. — La coloration spéciale de plusieurs organes caractérise cette variété bien tranchée de celles connues.

G. Schmidt a fait connaître récemment (Entom. Blatter 47, 1951) un certain nombre de modifications variétistes de *Cerambycidæ* pouvant se retrouver en France et qu'il convient de ne pas ignorer, dont 3 *Clytini* (qui sont figurés) basés sur les dessins clairs des élytres réduits ou divisés. Je ne connais pas ces modifications en nature mais, les jugeant intéressantes, je vais les signaler brièvement et successivement.

Xylotrechus arvicola f. *Abbreviata* (p. 14), voisine de f. *Quadrifaculata* Kan. ayant les dessins postérieurs jau-

nes des élytres éloignés de la suture et la macule apicale réduite.

Plagionotus detritus f. *anticereducta*, ayant la portion basale des élytres très foncée et seulement ornée d'une tache transversale jaune avant le milieu, et postérieurement munis de bandes jaunes complètes et tranchées.

Plagionotus arcuatus f. *interrupteconnata* (p. 15). Voisine de la v. ou a. *connatus* Mors., mais avec seulement les macules internes 2 et 3 réunies sur chaque élytre, tandis que la 4^e (externe post.) reste isolée. Chez la v. *connatus* Mors., ces trois taches sont conjointement réunies. A propos de ces nouvelles modifications, je crois devoir faire remarquer que leur descripteur les présente sous le terme f. : *forma*, tandis que le docteur Breuning, dans une monographie récente du genre *Phytæcia* Muls. (*Ent. Arb. Museum J. Frey*, p. 2, 1951), a adopté le terme m. : *morphia*, inauguré, je crois, par les auteurs russes ; ces changements de termes n'aboutissent à rien de plus précis. Après le système plus récent du terme *aberration* (remplaçant *variété*), et, pour ma part, je ne vois pas qu'il soit nécessaire (en vue d'être mieux compris) de laisser tomber le qualificatif ancien *variété*, généralement adopté.

Phytæcia curtipennis n. sp. [Longicorne]. Assez court et peu étroit, noir à reflets métalliques, à pubescence blanchâtre ou un peu jaunâtre, dense en dessous du corps et formant, sur le dessus, trois bandes nettes au pronotum, une bordure suturale et une externe peu marquée aux élytres. Tête densément pubescente, à ponctuation forte et écartée sur le vertex, plus fine en avant ; antennes un peu plus longues que le corps, nettement annelées de blanc à la base des articles 4 et suivants. Thorax peu long et assez large, nettement plus étroit que les élytres, presque droit sur les côtés, à ponctuation diversement grosse et écartée. Ecusson densément pubescent. Elytres assez courts, atténués à l'extrémité, un peu

déhiscents et subarqués eu sommet, à ponctuation plutôt fine et diversement écartée. Pattes assez robustes, très pubescentes. L. 8 m. Chine. — Espèce d'un classement générique douteux, paraissant proche, par ses antennes relativement longues, de *Epiglenea* Bat., selon Breuning mais à faciès plutôt de *Phytæcia* Muls. Est caractérisé, à première vue, par les élytres plus courts que normalement.

Mordella saigonensis n. sp. [Hétérom.]. Assez court et un peu élargi, atténué à l'extrémité, brillant, noir, revêtu d'une pubescence blanche qui se condense sur les élytres de façon à former une bande suturale jointe à une fascie humérale oblique allongée sur chaque étui également blanche. Avant-corps robuste, élytres peu longs, subarrondis au sommet. Pygidium peu long et assez mince. L. 4 m. Saïgon (ex Barbier). — Peut se placer près de *Waterstradti* Pic, ce dernier ayant une forme plus trapue, les dessins des élytres différents.

Mordellistena angustata n. sp. Etroit et long, brillant, peu pubescent, noir, avant-corps, sommet de l'abdomen et pygidium testacés, membres testacés, majeure partie des pattes postérieures noire. L. 2 m. environ : Saïgon (ex Barbier). — Voisin de *longissima* Pic, en diffère par les élytres entièrement noires, les pattes postérieures largement foncées, etc.

M. Micheli mihi, de Hoa-Binh, voisin du précédent par sa coloration et sa forme, est un peu plus grand et moins étroit, le pygidium est plus long, le pygidium et l'extrémité de l'abdomen sont noirs. L. 3 mill.

Falsoprogenia n. g. [Hétéromère]. Tête étroite et assez longue, tempes non raccourcies ni nettement atténuées postérieurement ; yeux petits, saillants. Thorax ayant sa plus grande largeur au milieu, rétréci en arrière et davantage en avant ; élytres à peine plus larges que le thorax, s'élargissant avant le sommet. Forme étroite et

relativement allongée, membres grêles. Genre voisin de *Praogena* Maek. (caractérisé principalement par la forme de la tête et du thorax) établi pour l'espèce nouvelle suivante.

Falsoprogenia luteolineata n. sp. Allongé, presque opaque en dessus, noir, les élytres ayant une bordure suturale, sur chacun, une bande étroite discale raccourcie aux deux extrémités, placée sur le 4^e intervalle et une courte ligne humérale jaunes. Antennes grêles, filiformes, pas très longues. Tête bien plus étroite que le thorax, à ponctuation granuleuse dense et forte, analogue à celle du thorax. Elytres longs, plus étroits aux deux extrémités, finement strié-ponctués avec les intervalles diversement larges, plutôt déprimés. Pattes grêles, longues, antérieures plus courtes avec les tibias un peu arqués. L. 11 m. Erythrée.

Zonabris bifasciata v. n. *ivoirensis*. Elytres noirs ornés de deux larges bandes transversales jaunes séparées par une étroite bande sinuée noire. Côte-d'Ivoire.

Cyaneolytta Crampeli n. sp. [Hétéromère]. Allongé, avant-corps un peu brillant, élytres opaques, dessous verdâtre avec la poitrine à grande tache rouge, dessus noir avec les élytres un peu bleutés. Tête grosse, à forte ponctuation ; antennes aplaties. Thorax plus long que large, rétréci en avant, à forte ponctuation rapprochée avec un sillon médian et une impression basale. Elytres finement et densément granulés, sans côtes marquées. L. 20 m. Fort-Crampel. — Peut se placer près de *subcoriacea* Maëk., thorax différent, antennes plus aplaties.

A signaler l'intéressante capture de *Anthicus tobias* Mars., faite par mon collègue Barbier à Toulon. Espèce orientale, déjà signalée en Angleterre et en Belgique, mais nouvelle pour la faune française.

Anthicus trinotatipennis n. sp. [Hétéromère]. Plus ou moins allongé, brillant, orné de longs poils, fortement

ponctué en dessus, testacé, élytres ayant chacun 3 macules noires, une humérale, une médiane, parfois en fascie, remontant en avant sur les côtés, une commune préapicale. Membres clairs. L. 3 m. Saïgon (ex Barbier) (1). Voisin de *longehirsutus* Pic avec les élytres moins larges et moins fortement ponctués.

A. pilipennis n. sp. Oblong, brillant, orné de longs poils, dessus à forte ponctuation, roux, élytres noirs, ornés chacun d'une macule anté-médiane et d'une fascie post-médiane oblique jaunes, apex également jaune ; membres testacés. L. 2,5 m. Saïgon (ex Barbier). — A placer près de *binhensis* Pic, qui a l'avant-corps noir et l'apex des élytres non marqué de clair.

La *v. botanicus* mihi, également de Saïgon, de taille moins petite, a la fascie postmédiane claire non oblique.

Authicus flavicolor Pic (Op. Mart. X, 1943, p. 11) préoccupé est à muter en *flavicoloratus*.

A. dentaticeps n. sp. Allongé, brillant, peu pubescent, roux avec les élytres marqués de foncé sur les côtés médians et à l'extrémité, membres testacés. Tête large, particulière, angulée sur les tempes. Thorax assez long, un peu dilaté-subarrondi en avant, densément ponctué. Elytres plus larges que le thorax, peu longs, à ponctuation moyenne, écartée, soit marqués de foncé (*forme typique*), soit sans dessins (*v. n. obliteratus*). L. 2 m. Saïgon (ex Barbier). — Par la structure de la tête, se rapproche de *anguliceps* Laf., des Indes, mais ce dernier n'a pas de macule apicale foncée aux élytres.

A. insignatifer n. sp. Petit, étroit, brillant, peu pubescent, roux, sans dessins foncés. Tête assez grosse, subtronquée postérieurement, peu ponctuée ; antennes tes-

(1) Les types des nouveautés de Saïgon sont dans ma collection, mais des co-types d'un certain nombre de celles-ci se trouvent dans la coll. Barbier.

tacée, peu courtes, moins grêles à l'extrémité. Thorax court et peu large, élargi-subarrondi en avant, assez fortement et densément ponctué. Elytres peu plus larges que le thorax, subparallèles, courtement atténués à l'extrémité, sans impression, à ponctuation assez fine et rapprochée. Pattes courtes et grêles, testacées. L. 2 m. environ. Saïgon (ex Barbier). — Peut se placer près de *rubidus* Pic, qui est moins étroit avec les élytres fasciés postérieurement de noir.

A. Belhaisei n. sp. Allongé, brillant, à pubescence grise espacée et poils hirsutes, un peu brillant, roux ou testacé avec les élytres ayant chacun une macule noire de poix basale, une fascie prémédiane et une macule suturale subapicale de même coloration, membres testacés. Antennes longues et grêles. Tête large, subtronquée en arrière, à ponctuation fine. Thorax court, trapézoïdiforme, dilaté globuleusement en avant, à ponctuation forte, rapprochée. Elytres longs, atténués à l'extrémité, sans dépression sensible à la base, à ponctuation forte, un peu écartée. L. 2,5 m. Congo. — Voisin de *setifer* Heb., avec les élytres marqués de foncé à la base.

A. subrobustus mihi, du Congo, de coloration analogue au précédent, est trapu, plus large, avec les antennes plus courtes, une ponctuation plus écartée sur le thorax.

Formicomus congoensis n. sp. [Hétér.]. Allongé, brillant, noir, élytres verts, antennes testacées, foncées à l'extrémité. Tête rétrécie et un peu cônique postérieurement, assez fortement ponctué; thorax peu plus long, modérément élargi antérieurement, peu ponctué. Elytres à épaules marquées, peu longs, atténués à l'extrémité. ♂ à cuisses antérieures munies d'une forte dent, tibias nettement angulés et échancrés en dedans. L. 3 m. Congo. — Sans doute voisin de *nigrocyanus*, Laf., avec une autre structure des pattes antérieures.

F. angustipennis v. n. Risbeci. Diffère de la forme typique par le thorax plus clair sur la base, les élytres moins étroits, à coloration nettement verdâtre. Sénégal.

Antelephilus ovipennis n. sp. [Hétér.]. Oblong-allongé, convexe, brillant, noir, antennes et base des cuisses rousses, élytres avec deux bandes transversales de pubescence blanche. Avant-corps à ponctuation fine et écartée. Elytres à épaules complètement effacées et très bombés, tronqués au sommet, dépassés par le pygidium. L. 3 m. Congo belge. — Par sa forme analogue à *subfasciatus* Pic, mais très distinct par son avant-corps peu ponctué et brillant.

Eurymetopum maculatum v. n. lateobscurum [Cleride]. Thorax largement foncé, ainsi que les élytres dont le fond est d'un gris obscur et sont ornés de petites macules prébasales flaves, d'une autre, sur chacun, vers le milieu et près de la suture, celle-ci marquée de foncé au centre, sommet assez largement clair. Chili.

E. subimpressum v. n. rufescente. Largement roussâtre sur l'avant-corps, élytres jaunes, presque concolores, vaguement rembrunis par places sur les côtés et vers le milieu. Chili.

Spermophagus Clermonti n. sp. [Bruchide]. Oblong-subovale, brillant, noir, roux par places, partie postérieure de l'abdomen avec le pygidium, les antennes en partie et partie des pattes rousses, à revêtement gris sans mouchetures ; pattes postérieures avec les éperons noirs. L. 5 m. Pérou. — Par sa forme, voisin de *basipennis* Pic avec une toute autre coloration et le pygidium concolore.

S. nigromarginatus v. n. Mathani. Allongé, atténué aux deux extrémités, brillant, à revêtement gris ou jaunâtre, roux, noirâtre par places, les élytres ayant une bordure noire latérale, mais pas de macules foncées dispersées en dessus. Pérou.

S. nigronotatus n. sp. Oblong-ovale, brillant, noir ;

base des antenens et quatre pattes antérieures rousses, revêtu d'une pubescence grise disposée en nombreuses mouchetures sur le dessus du corps avec une bande transversale noire prémédiane, la partie postérieure des élytres étant un peu roussâtre et aussi mouchetée. Eperons des tibias postérieurs roux. L. 4 m. Amazone. — A placer près de *minasensis* Pic qui n'a pas de fascie noire aux élytres.

Caryopemon Lhostei v. n. Nathani. Noir, élytres ayant des dessins blancs ou jaunes faits avec des mouchetures plutôt séparées. Indes Mér.

Syagrus gabonicus n. sp. [Eumolpide]. Oblong-subovaire, convexe, brillant, noir verdâtre, antennes rousses à la base. Thorax court, très rétréci en avant, à ponctuation fine et écartée. Elytres un peu plus larges que le thorax, courts et larges, à épaules arrondies, mais un peu saillantes, courtement atténués à l'extrémité avec des stries non complètes et des rangées de petits points. L. 6 m. Gabon. — Espèce se distinguant par ses pattes foncées

S. obscuripes n. sp. Oblong, convexe, brillant, noir verdâtre avec le thorax faiblement doré, antennes rousses à la base. Tête avec une impression allongée entre les yeux. Thorax assez court et étroit, à ponctuation très fine et très espacée, bien plus étroit que les élytres. Elytres larges et courts, courtement atténués à l'extrémité, à épaules arrondies, ayant des rangées de points peu gros sans stries marquées. Cuisses presque inermes. L. 6 m. Afr. C^e. — Forme plus allongée que la précédente, avec les élytres sans stries marquées.

Nerissus uniformis n. sp. [Eumolpide]. Oblong, brillant, orné d'une longue pubescence grise non dense et régulièrement disposée sur les élytres qui ne présentent pas de parties longitudinales dénudées, coloration noire avec le dessus du corps un peu olivâtre. L. 7 m.

Dahomey. — A placer près de *strigosus* Chp., bien caractérisé par la disposition spéciale de la pubescence élytrale.

Nerissidius rugulosus v. n. *cyaneipennis*. Avant-corps vert, élytres bleus. Fort Sibut.

Lamprobothris nigra n. sp. [Hétér.]. Allongé, un peu atténué postérieurement, peu brillant, noir. Thorax court et large, à ponctuation forte, diversement écartée, plus étroit que les élytres. Elytres longs, progressivement atténués postérieurement, à rangées de fovéoles de longueur et grosseur diverses. L. 22 m. Congo : Katanga. — Caractérisé par sa coloration noire sans reflets métalliques.

Calleros Fritzii n. sp. [Lycide]. Allongé, un peu large, plus étroit en avant, brillant, noir, thorax bordé largement de jaune en avant et sur les côtés, celui-ci large, court, à angles postérieurs saillants. Elytres noirs, à étroite ligne humérale jaune, à côtes nettes et à peu près égales, intervalles à aréoles fenestrées en partie carrées, embrouillées à l'extrémité. Antennes à articles 3 et suivants plus ou moins prolongés en dent à leur sommet externe. L. 7 m. Brésil (ex Plauman). — Peut se placer près de *guyanensis* Pic, plus brillant, thorax plus large, sculpture élytrale différente et épaules marquées de clair.

Calleros latemaculatus n. sp. Allongé, étroit, subparallèle, peu brillant, noir, thorax jaune, largement noir au milieu, hanches claires. Antennes pileuses, à articles 3 et 4 larges, 5^e et suivant diversement longs ou dentés au sommet antérieur. Thorax assez court et large, à angles postérieurs peu saillants. Elytres très longs, à côtes égales, peu saillantes, intervalles à aréoles fenestrées plutôt subcarrées, embrouillées au sommet. L. 6 m. Brésil. — A placer près de *infernalis* Gorh., thorax plus large et largement marqué de noir, etc.

Mimaploglossa n. g. [Helodide]. Tête horizontale, très

dégagée du thorax, celui-ci non rebordé en avant, fortement impressionné de chaque côté. Elytres très longs et étroits. Hanches sans trochantins ; pattes longues, tarses grêles et simples, ongles appendiculés. Faciès de *Aploglossa* Guer., mais les tarses sont simples, la tête est petite, le thorax particulier. Genre établi pour l'espèce suivante.

M. Drescheri n. sp. Etroit, allongé, pubescent de gris, brillant, noir, pourtour du thorax en partie roux, écusson roux, élytres en majeure partie roussâtres, obscurcis vers l'extrémité. Antennes noires, à deux premiers articles roux, non grêles, longues, 3^e et articles suivants longs, un peu angulés au sommet. Tête plus étroite que le thorax, fortement granulée. Thorax peu long, rétréci en avant, sinué postérieurement, de la largeur des élytres en arrière, avec une grande impression inégale de chaque côté, les angles postérieurs saillants, à ponctuation granuleuse peu forte, non dense. Elytres longs, subparallèles, atténués à l'extrémité avec des stries internes, une ponctuation forte et irrégulière. Pattes rousses, tarses plus clairs. L. 5 m. Java : Preanger (ex Drescher).

Curtoscirtes n. g. [Helodide]. Forme hémisphérique, courte et large, élytres largement explanés et creusés latéralement, ornés de côtes. Tête à peine bifovéolée ; thorax très transversal, échancré sous les yeux ; écusson grand. Genre voisin de *Ora* Cl., caractérisé, au premier coup d'œil, par la forme courte très explanée des élytres avec ces organes munis de côtes ; établi pour l'espèce ci-dessous et les trois suivantes.

Curtoscirtes diversipennis mihi (1). Roux ou testacé, avec les élytres mélangés de brun et de clair ; élytres

(1) Une série d'espèces (désignées ici par le terme *mihi* remplaçant *n. sp.*) nommées depuis longtemps et certainement décrites, ont-elles été publiées déjà ? Ce n'est pas impossible, mais je ne le crois pas.

fortement explanés même à l'extrémité, avec une forte impression derrière l'écusson et des côtes très inégales ; cuisses postérieures marquées de brun. L. 4 m. Bornéo.

C. subacuminatus mihi. Subovalaire, élytres un peu acuminés à l'extrémité, pubescent de gris, brillant, roux ou testacé, élytres obscurcis par places avec une impression nette derrière l'écusson, peu rebordés à l'extrémité avec des côtes diverses dont une faible interne. L. 4,5 m. Mindanao.

C. coccinelloides mihi. Subovalaire, élytres non atténués et subarrondis au sommet, roussâtre, élytres obscurcis par places, brillant, pubescent de gris ; élytres avec des côtes externes pas très saillantes et raccourcies. L. 5 m. Mindanao.

C. annulifer mihi. Testacé, élytres ornés d'un anneau noir s'interrompant vers la suture en avant et en arrière ; élytres ayant une côte interne que n'a pas la précédente espèce et de faibles côtes externes. L. 4 m. Mindanao.

Ora singaporensis mihi. Subovalaire, pubescent de gris, brillant, roux, rembruni par places, membres testacés. Tête nettement bifovéolée ; élytres fortement marginés. L. 2,5 m. Singapore. — Voisin de *costifera* Pic, moins foncé et sans côtes.

O. samarensis mihi. Oblong-subovalaire, atténué postérieurement, pubescent de gris, brillant, finement et densément ponctué, testacé, élytres fortement explanés, sauf à l'extrémité, ayant des traces de costules L. 4 m. Ile Samar. — Sans doute voisin de *irregularis* Wat., mais sans dessins foncés aux élytres.

O. notatithorax mihi. Subovalaire, peu pubescent, brillant, testacé, thorax orné de petites taches brunes, élytres ayant des dessins noirs sur la base et le milieu, sans atteindre la suture, avec une ligne discale sinuée

sur chacun avant le sommet. L. 3 m. Los Banos. — Peut-être var. de *irregularis* Wat. La *v. innotatithorax* de Luzon a le thorax immaculé et les élytres sans dessins noirs à la base.


Scirtes vagesignatus n. sp. [Helodide]. Oblong-allongé, pubescent de gris, brillant, brun de poix, avec l'avant-corps roussâtre, les élytres foncés ayant une macule jaune plus ou moins étendue en dessous des épaules; antennes foncées à base testacée; pattes testacées. L. 2,2 m. Saïgon (ex Barbier). — Peut se placer près de *constans* Pic, plus petit et plus atténué postérieurement, élytres particulièrement marqués de clair.

Scirtes albomaculatus Brg. Varie par la bande antérieure blanche interrompue (*v. n. trimaculatus*), ou celle-ci interrompue aussi, mais élytres n'ayant pas de macule postérieure blanche (*v. n. binotatus*). Saïgon (ex Barbier).

Scirtes balbalanus mihi. Oblong-subovale, brillant, pubescent de gris, noir de poix avec la tête rousse, le thorax et les membres testacés; antennes un peu rembrunies à l'extrémité; avant-corps plus finement ponctué que les élytres. L. 2 m. Luzon : Balbalan. — Peut se placer près de *laticollis* Pic, moins large et autrement coloré.

Le **S. montalbanus** mihi, des Philippines, voisin du précédent, mais avec une forme plus allongée, est testacé, les élytres étant un peu rembrunis sur le disque, le dessous du corps est largement rembruni, les membres sont testacés. L. 2 m. environ.

Calvarium rufosuturale n. sp. [Helodide]. Assez large, oblong, atténué postérieurement, brillant, pubescent de gris, roux, thorax et élytres noirs, ces derniers avec une étroite bordure suturale rousse, membres testacés. L. 3,5 m. Congo. — Voisin de *Maxi* Pic avec une coloration différente, les élytres ayant une bordure suturale claire.



Cyphon latior n. sp. Large, subovalaire, brillant, pubescent de gris, roux-testacé, élytres à ponctuation moins fine que celle du thorax, ceux-ci peu longs, atténués à l'extrémité. L. 3 m. Congo. — Voisin de *innotatus* Pic, mais plus large.

C. guineensis n. sp. Petit, subovalaire, convexe, brillant, pubescent de gris, finement ponctué, à coloration générale d'un roux testacé. L. à peine 2 m. Guinée. — Voisin de *Lyauteyi* Pic, mais avec les élytres plus larges à la base par rapport au thorax.

C. Conradsi n. sp. Petit, subovalaire, brillant, pubescent de gris, noir avec les membres testacés ; élytres impressionnés, ou déprimés en partie vers la suture, assez courts, atténués à l'extrémité. L. 2 m. Tanganyka. — A placer près de l'espèce suivante nommée *minutissimum*.

C. mirabile n. sp. Petit, subovalaire, brillant, à pubescence d'un blanc argenté dessinant (dans certaines positions visuelles) une sorte de bande postérieure argentée, noir avec l'avant-corps et les membres testacés. Avant-corps assez finement ponctué, ainsi que les élytres, ces derniers subarqués sur les côtés, atténués à l'extrémité, peu rebordés en avant, à épaules marquées. L. 1,5 m. Saïgon (ex Barbier). — Jolie petite espèce caractérisée en partie par sa pubescence argentée.

C. minutissimum n. sp. Petit et voisin du précédent, mais plus oblong, avec la pubescence blanche non argentée, les élytres à transparence jaune et même en majeure partie de cette coloration. L. 2 m. environ. Saïgon (ex Barbier).

Scirtes subparallelus mihi. Grand, allongé, subparallèle, brillant, finement ponctué, roussâtre. L. 4 m. Mindanao. — Caractérisé par sa forme allongée et sa taille relativement grande.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Contribution à l'étude des <i>Pilemia</i> Frm. (Longicornes).	1
Coléoptères divers nouveaux ou peu connus, notes	4